



ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ENDODONTİ ANABİLİM DALI AYDINLATMA VE ONAM FORMU

Doküman Kodu
HHD.RB.10

Yayın Tarihi
25.12.2024

Revizyon Tarihi

Revizyon No
00

Sayfa Sayısı
1 / 2

ENDODONTİ ANABİLİM DALI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

Sayın Hasta/Kanuni temsilcisi;

Bu **RIZA** (Onam) formunun amacı; Tedaviniz için uygulanacak tüm işlemler/uygulamalar sırasında, karşılaşılabilecek muhtemel yan etkiler hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilmenizi sağlamak, bunları bilerek muayene ve tedaviyi kabul ettiğinizi belgelemek, sizden Onay alıp, imza altına alınmasıdır.

Tıbbi tedavinin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek veya göstermemek yine kendikararınıza bağlıdır.

Tedaviye başlamadan önce, geçirmiş olduğunuz, sistemik, bulaşıcı hastalıklar veya alerjinizin olup olmadığı hususların hekiminizle paylaşmanız önem arz etmektedir.

Tüm tedavilerin başarı oranı çok yüksek olmasına rağmen garanti edilemeyeceği, dolayısıyla tedavi edilen dişlerin çekimin gerekebileceği, ileriki dönemlerde tedavinin ve hastalığın tekrarlayabileceği bilinmelidir.

Tedavi sırasında ve sonrasında ilaç tedavisi gerekebilir. Bunların kullanım süreleri, kullanım şekilleri hekimin belirttiği şekilde uygulanmalıdır. İlaçların yan etkileri durumunda da hasta hekimine başvurulmalıdır.

Tedaviniz sırasında ağrı ve acı hissedilmesini engellemek için lokal (belli bölgenin uyuşturulması) veya rejyonel (sinir dokusunun blok halinde uyuşturulmasına) anestezi gerekebilir. İşlem yaklaşık 5-25 dakika sürmektedir. Etkisi 1-4 saat sürebilir. Anestezi sonucu fasiyal paralizi (geçici yüz felci), amfizem (yüzde şişlik), hematoma (yüzde kızarma, morarma) gibi komplikasyonlar oluşabilir. Uyuşukluğa bağlı dudak, yanak ve dil ısırmalarına bağlı travmatik yaralanmalar olabilir. Bazen alt dudakta ve dilde anesteziye bağlı olarak geçici ya da kalıcı uyuşukluk oluşabilir. Anestezi sonucunda ayrıca alerjik reaksiyon (anafilaktik şok) oluşabilmektedir. Solunum durması, yavaşlaması veya kalp durması işlem sırasında gerçekleşebilir. Bu durumda acil müdahale edilmesi gerekmektedir. Bunun için hastanın herhangi maddeye alerji olup olmadığını (penisilin alerjisi vb.) tedaviye başlamadan önce ve hekim gerçekleştirilemeyebilir. Lokal anestezi yapıldıktan sonra belli bir süre yeme içme ve çiğneme yapmayınız. Tedaviye başlamadan önce anestezi sırasında yaşadıkları bir olumsuzluk varsa belirtiniz.

Tedaviyi reddetme veya sonlandırma hakkınızı kullanmak isterseniz hekiminize bildiriniz.

Onayınızdan sonra da olsa işlem başlanmamış ise onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz.

Hizmetlerimizde ilgili görüş, öneri, teşekkür ve şikâyetleriniz için; Hasta iletişim birimine başvurabilir, Hastanemizde bulunan öneri ve dilek kutularına atabilir,

İşlemin Tanımı: Derin çürük veya travma nedeniyle pulpa dokusunun geri dönüşümsüz olarak etkilendiği pulpitis ya da nekroz durumlarında, dişlerde mevcut bulunan çürükler, gerekli ise lokal anestezi ile frezler ve/veya el aletleri kullanılarak tamamen temizlenir, pulpa dokusu (dişin damar ve sinir içeren kısmı) endodontik aletler yardımıyla tamamen çıkarılır (kanal tedavisi) ve dişte mevcut bulunan kanallara pansuman solüsyonları ile gerekli görülen sayıda pansuman yapılır. Daimî dişin kanalları, diş ile ilgili semptomlar ortadan kalktığında kanal dolgu malzemeleri ile doldurulur. Kanal dolgusu tamamlandıktan sonra uygun dolgu maddesi ya da kronlar ile restorasyon yapılır.

İşlemin Kim tarafından ve Nerede Uygulanacağı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı hekimlerinin, hemşirelerinin, araştırma görevlilerinin, doktora öğrencileri ve diş hekimliği lisans öğrencilerinin teşhis ve tedavilerinin tüm aşamalarına katılmalarını kabul ediyorum. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin bir eğitim kurumu olduğunu ve yapılacak tedavilerden öğrencilerin eğitimine katkıda bulunacak şekilde faydalanabileceğimi kabul ediyorum.

Olası Yan Etkiler, Riskler ve Komplikasyonlar; Tedavi uygulamaları sırasında yapılmış olan tedavi planından farklı veya bunlara ilave tedavilerin yapılmasını gerektiren beklenmedik durumların oluşabileceğini anlıyorum. Bu durumda yeni tedavi uygulanmadan önce tarafıma danışılacaktır. Tıp ve Diş Hekimliği birimlerinin sonuçları garantili olan bilim dalları olmadığının farkındayım ve endodonti kliniğinde hastaların almış oldukları ağız- diş tedavilerinin sonuçları hakkında bir garanti verilmeyeceğini kabul ediyorum. Planlanan işlemler ve tedaviler



ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ENDODONTİ ANABİLİM DALI AYDINLATMA VE ONAM FORMU

Doküman Kodu
HHD.RB.10

Yayın Tarihi
25.12.2024

Revizyon Tarihi

Revizyon No
00

Sayfa Sayısı
2 / 2

sırasında meydana gelebilecek istenmeyen sonuçlar bana açıklanmıştır. Bunlar aşağıda belirtilmektedir. Ancak bunlarla sınırlı değildir.

- Kanal tedavisi yapılırken, kullanılan aletler kanal içerisinde veya dışarısında kırılabilir, bu durumda alet kanal içinde bırakılabilir veya dış çekime gidebilir.
- Ayrıca kök kanalları tıkalı olabilir, buna bağlı olarak kanal doldurulamayabilir, kökün eğriliğine ve yarıda tıkalı olmasına bağlı olarak yarım doldurulabilir veya tedavisi yapılamayabilir. Kök kanalı yıkama solüsyonları, medikamanlar ve kök kanal dolgu materyalleri kök kanal ucundan öteye taşabilir.
- İşlem sırasında ve sonrasında ağrı, apse, diş eti kanaması, şişlik oluşabilir, lokal veya sistemik enfeksiyon gelişebilir.
- Tedavi sonrasında bir hafta on gün kadar dişin üzerine basarken, yemek yerken ağrı şikayeti olabilir. Çene eklemünde rahatsızlıklar görülebilir. Anestezi yapılan bölgede birkaç gün hassasiyet olabilir. Bu şikâyetin zamanla azalarak geçmesi beklenir.
- Dişin konumu, hastanın ağız açıklığı, dil, yanak ve komşu dokuların anatomik yapısı nedeniyle çalışma sırasında kök kanal aletleri ağız boşluğuna düşebilir. Hasta diliyle refleks olarak kanal aletini geriye itebilir, aspire edebilir (solunum yoluna kaçabilir).
- Kanal tedavisi yapılırken çalışmaya bağlı olarak dudaklarda ve ağız köşelerinde çatlak ve yırtıklar, şişlikler, morarma ile çene eklemünde ağrı ve hassasiyet ortaya çıkabilir.
- Kök veya diş kırılabilir. Komşu dişte ve çevre dokularda yaralanma olabilir.
- Kanal tedavisi yapılmasına rağmen, tedavinin hemen akabinde veya bir süre sonra dişin çekimi gerekebilir. Kanal tedavisi başarılı olsa bile, daha sonra o dişin bir daha ağrımayacağı anlamına gelmez. İşlem sonrasında ısırmada ağrı duyulabilir. Bu durum geçici bir durumdur. Süresi kişiden kişiye değişebilir.
- Eğer kanal tedavisi yapılmasına rağmen, kendiliğinden başlayan zonklama tarzında şiddetli ağrılar veya şişlik oluşursa, dişin çekilmesi gerekebilir. Bu durumda son kararı doktorunuzun vermesi gerekmektedir.

Açıklama: 18 yaş üzerindeki hastaların kendilerinden, 15-18 yaş arasındaki hastaların kendilerinden ve yasal temsilcilerinden, 15 yaş altında olan ve karar verme yetkisi bulunmayan hastaların yasal temsilcilerinden Onam (Rıza) belgesi alınır.

Tedaviyi reddetme veya sonlandırma hakkımın olduğunu biliyorum. Sözel ve yazılı tüm bilgilendirmeleri yeterli buluyorum. Yapılacak tüm muayene ve tedaviler için ‘Aydınlatılmış Rıza (Onam) Formu’ nu okudum, anladım, kabul ediyorum ve özgür irademle onaylıyorum.

Aydınlatılmış bu Onam Formunu ‘Hasta kendi el yazısı ile ‘okudum, anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım’ yazacaktır.

Hasta / Kanuni Temsilcisi Adı Soyadı: (Hasta için barkod etiket yapıştırılabilir)

Rızanın alındığı Tarih: / / 20.....

İmza:

Saat: /

Hekim Adı Soyadı/Ünvanı:

İmza: / / 20.....

Saat: /