



ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

HAREKETLİ PROTEZ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

Doküman Kodu HHD.RB.15	Yayın Tarihi 25.12.2024	Revizyon Tarihi	Revizyon No 00	Sayfa Sayısı 1 / 2
---	--	------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Sayın Hasta / Kanuni temsilcisi;

Bu RIZA (Onam) formunun amacı; tedaviniz için uygulanacak tüm işlemler/uygulamalar sırasında, karşılaşılması muhtemel yan etkiler hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilmenizi sağlamak, bunları bilerek muayene ve tedaviyi kabul ettiğinizi belgelemek, sizden onay ve imza almaktır. Tıbbi tedavinin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek veya göstermemek yine kendi kararınıza bağlıdır. Tedaviye başlamadan önce, geçirmiş olduğunuz sistemik (kalp, tansiyon, şeker, böbrek, epilepsi, guatr vb)/ bulaşıcı hastalıklar (hepatit, aids) hakkında ve kemoterapi ve radyoterapi alıp almadığınız, alerjik reaksiyon gösterip göstermediğiniz konularında hekiminizi bilgilendirmeniz önem arz etmektedir. Sizde mevcut bir sistemik hastalık varlığında ya da kullandığınız ilacın yapılacak tedaviyi olumsuz etkilemesi halinde doktorunuzdan konsültasyon istenebilir. Sağlıklı bir ağız yapısına sahip olmanız için gerekli önlemler konusunda tedavinin her aşamasında bilgiler sizinle paylaşılacaktır.

İşlemin tanımı; Total protezler ağızda hiç dişi bulunmayan hastalarda yapılan hareketli protezlerdir. Protezin tutuculuğu çene kemiklerinin ve ağız içi dokuların durumuna, dilin büyüklüğüne, konumuna ve hastanın göstereceği uyuma bağlıdır. Bölümlü (kancalı) protezler kısmi diş eksikliğinde uygulanan, metal ve akrilik (plastik) kısımları bulunan, kroşe (kanca) adı verilen metal parçalarla veya hassas tutucu adı verilen unsurlarla dişe tutunmayı sağlayan hasta tarafından takılıp çıkarılan protezlerdir.

İşlemin kim tarafından ve nerede uygulanacağı; Tedaviniz diş hekimi tarafından diş kliniğinde steril malzemeler ile protetik kurallara uygun şekilde yapılır. Protezinizin yapımına başlamadan önce SGK tarafından belirlenen katkı payını ödemeniz gerekir.

İşlemden beklenen faydalar ve alternatif tedavi yöntemleri; Tedavinin amacı diş eksikliğini tamamlayarak çiğneme işlevini yerine getirmek, ağız içerisindeki eksik dokuları yerine koymak, daha estetik bir görüntü elde etmek ve konuşmayı düzeltmektir. Ağız yapınızın izin vermesi halinde hareketli protezler yerine çene kemiklerine implantlar yerleştirilerek implant üstü sabit veya implant üstü hareketli protezler planlanabilir.

Proteze başlamadan damakların değerlendirilmesi; Proteze (ölçü alım işlemine) başlamadan önce hekiminiz dişlerinizi ve damaklarınızı muayene ederek yapılacak protez ve olası sonuçları hakkında sizi bilgilendirecektir. Yapılan muayenede kemik yapısı ve seviyesi (özellikle alt çenedeki kemik seviyesi önemlidir), damaklardaki yumuşak doku büyümleri (epulis vb), daha önce çekilmiş diştten dolayı kalan parça ve kemik çıkıntıları, varsa damaklardaki yaralar (aft, mantar, lökoplaki vb) değerlendirilir.

Olası yan etkiler, riskler ve komplikasyonlar; Bölümlü (kancalı) protezlerde özellikle kancanın geldiği dişlere özen gösterilmeli, temizlenmesine dikkat edilmelidir. Eğer dikkat edilmezse kancanın geldiği dişlerde çürüme başlar ve dişin tedavi ihtiyacı veya çekilmesiyle sonuçlanabilir. Ön dişlerde kroşelerin (kancaların) görünmesinden dolayı estetik sorunlar yaşanabilir. Daha çok alt çenede olmak üzere anatomik yapıların (dil vb) konumundan ve kemik seviyesinin yetersizliğinden dolayı protezin tutmasında sorunlar yaşanabilir. Özellikle tam protezlerde alt çenede yeterli protez tutuculuğu sağlanamayabilir. Hasta proteze alıştıkça protezin oynaması sorun olmaktan çıkacaktır. Protezlerinin teslim edildikten sonra vuruk, protezin metal ve akrilik parçalarında kırılma ve kopma, yapay dişlerde düşme görülebilir. Protezde kullanılan metal veya akrilik parçalara karşı alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Tükürük salgısında geçici bir süre artış gözlenebilir. Özellikle ilk kez hareketli protez kullanan hastalarda bulantı hissi ve konuşma problemleri meydana gelebilir.

İşlemin tahmini süresi; Protez yapımına yara iyileşmesinin ardından başlanır. Tedavi yaklaşık olarak 20-25 iş günü sürer.

İşlemin yapım aşamaları; Protez birinci ölçünün alınması, ikinci ölçünün alınması, çene ilişkilerinin belirlenmesi, dişli prova yapılması, protezin teslim edilmesi olmak üzere beş seansta tamamlanır. Hekiminizin gerekli gördüğü durumlarda aşamalar tekrar edilebilir. Protez teslim edildikten sonra kontrol ve vurukların alınması seansı planlanır.

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sorunlar; Önerilen tedavi uygulanmadığında dişeti ve kemik dokularda tahribat meydana gelir. Komşu ve karşıt dişler çekim boşluğuna hareket ederek dişlerin kapanışını bozar. Uzun dönem dişsizlik sonucu oluşan dişlerdeki hareket ve devrilmeler zamanla mevcut durumda protez yapılmasını imkansız hale getirebilir. Bu durum çene ekleminde rahatsızlıklara neden olabilir.

Yaşam Tarzı Önerileri, Tavsiyeler; Proteze başladıktan sonra verilen randevulara uyulmaz tedaviye uzun süre gelinmezse yapılan dişler kötü uyum gösterir. Protezlerin yeniden yapımı ve ücret ödemesi gerekebilir. Total ve bölümlü protez kullanmaya başlayınca sizden her yemekten sonra protez fırçası veya diş fırçası yardımıyla fırçalayıp takmanız, günde 8 saat kadar protezlerinizi çıkararak dokuları dinlendirmeniz, protezinizi çıkardığınız dönemlerde su dolu bir kap ya da nemli bir pamuk veya havlu gibi bir materyal içerisinde muhafaza etmeniz beklenmektedir. Protez temizliği için eczaneden temin edebileceğiniz protez temizleyicileri kullanabilirsiniz. Protez temizliği amacıyla çamaşır suyu, deterjan gibi ürünler kullanmanız protezinize zarar verecektir. Dişetinin kapladığı kemik dokusundaki sivrilikler ve çıkıntılar, çiğneme esnasında proteze ilk temas eden bölgeler olduğu için dişetiniz yaralanabilir. Yaralanmalar meydana geldiğinde şikâyetlerinizde 3-4 günde azalma olmadığında hekiminize başvurarak protezinizden aşındırma yapmasını isteyebilirsiniz. Yaralanmaları gidermek için protezinize kendiniz müdahale etmeyiniz. Protezleriniz ile mutlaka çift taraflı çiğneme yapmalı, çok büyük lokma almaktan ve ön dişlerle ısırıktan (protez dengesini bozacağından) kaçınmalısınız. Her insanın kemik erime hızı farklılık gösterir. Zamanla eriyen çene kemiği ile protez arasını yeniden protez maddesiyle doldurmak (beslemek) gerekebilir. Bu durum protezin yenilenmesini gerektirebilir.

Yukarıda yazılanları okuduğumu, doktoruma genel durumumla ilgili doğru bilgiler verdiğimi, komplikasyonlar hakkında sözlü ve yazılı aydınlatıldığımı beyan ederek; tedaviyi durdurma veya reddetme hakkım olduğunu, verilen randevulara aksatmadan gelinmesinin, hekimin tedavi ile ilgili öneri ve uygulamalarına uyulmasının tedavi sonuçlarını doğrudan etkileyebileceğini bilerek doktorum tarafından yapılacak muayene ve tedavileri kabul ediyorum ve onaylıyorum.

Hasta / Hasta Yakını Adı Soyadı : (Lütfen kendi yazınızla 'OKUDUM VE ANLADIM' yazarak imzalayınız) İmza: Tarih:/...../ 20..... Sağ:/..... BARKOD	Hekim Adı Soyadı/Ünvanı: İmza:
---	---